



Probleemgedrag bij dementie

Delier tot het tegendeel
bewezen is

Letty Oudewortel, specialist ouderengeneeskunde

- Woonafdeling dementie met onbegrepen gedrag VIVA zorggroep
- Opname afdeling psychogeriatric Parnassia groep
- Vumc onderzoek delier bij dementie
- Disclosure belangen geen

Presentatie

- Dementie
- Delier
- Delier bij dementie
- Casus dhr. P
- Casus dhr. V
- Casus dhr. IJ

Dementie

- Cognitieve stoornissen, vaak geheugen problemen, maar ook desoriëntatie, afasie, apraxie, problemen in overzicht en planning
- (Langzaam) progressief

Delier

- Cognitieve problemen, desoriëntatie, geheugenproblemen, apraxie, dysartrie
- Acut ontstaan
- Fluctuaties over de dag
- Somatische oorzaak / medicatie gebruik

Delier bij dementie

- 2 syndromen met de zelfde symptomen
- Komen heel vaak samen voor
- Veroorzaken veel probleemgedrag

Kernsymptomen delier

- Bewustzijnsdaling
- Gestoorde aandacht


Belangrijk om het verschil te herkennen

- Ja
- Hoge lijdensdruk
- Slechte prognose
- Mogelijk behandelbaar

DIDAS = delirium in dementia scale

1. Bewustzijn	0	Grotendeels gewoon wakker en normaal alert	1	Soms opvallend afwezig, suf	2	Soms nauwelijks of niet wekbaar.
2. Aandacht	0	Kan gericht met iets bezig zijn of iets bespreken	1	Snel afgeleid	2	Geheel niet in staat aandacht op te brengen of te verplaatsen
3. Apathie	0	Doet uit zichzelf dingen (bijv. drinken/lopen)	1	Doet alleen iets na stimulatie (bijv. drinken/lopen) of reageert alleen na stimulatie	2	Onderneemt niets
4. Motoriek	0	Voor de patiënt normale bewegingen (rekening houdend met andere ziekten en medicatie (bijv. parkinsonisme))	1	Weinig bewegingen of juist licht toegenomen spontane bewegingen (bijv. 'plukgedrag')	2	Geen spontane bewegingen of juist voortdurende activiteit (bijv. 'plukgedrag')
5. Fluctuaties	0	Geen duidelijke fluctuaties wat betreft aandacht, gedrag, emoties, wanen of hallucinaties	1	Enige wisselingen in de ernst van de verschijnselen	2	Duidelijke schommelingen in ernst van verschijnselen
6. Angst	0	Niet angstig	1	Schrikachtig, niet extreem angstig (bijv. angstige blik)	2	Extreem angstig (bijv. transpireren)
7. Wanen	0	Geen wanen	1	Soms licht achterdochtig óf irreële gedachten , kan deze loslaten	2	Zeer achterdochtig óf overtuigd van irreële gedachten
8. Hallucinaties (of: illusoire vervalsingen)	0	Geen hallucinaties of illusoire vervalsingen	1	Soms waarnemingen die niet overeenkomen met de werkelijkheid	2	Voortdurend irreële waarnemingen waaraan wordt vastgehouden
9. Affect	0	Voor de patiënt normaal affect	1	Licht wisselend affect , met soms enige boosheid of enig verdriet	2	Sterk wisselend affect met soms extreme boosheid of extreem verdriet
10. Gedrag	0	Geen opvallende gedragingen	1	Soms inadequaate gedrag (bijv. uitkleden, katheter uittrekken, pleisters losmaken, meubilair verplaatsen, etc)	2	Vaak inadequaate gedrag (bijv. uit-kleden, katheter uittrekken, pleisters losmaken, meubilair verplaatsen, etc)

Dhr P Fragment 1



Dhr P Fragment 2




Dhr V Fragment 1



Dhr V Fragment 2



Dhr IJ Fragment 1



Dhr IJ Fragment 2



Dhr IJ Fragment 3

